

БИЛЕТ № 1

1. Первым действием при оказании первой помощи пострадавшему с открытым переломом должно быть:
 - а) обезболивание
 - б) остановка кровотечения
 - в) транспортировка в больницу
2. Для отморожения второй степени характерно:
 - а) наличие пузырей
 - б) наличие мертвых тканей
 - в) выраженное покраснение кожи
3. При капиллярном кровотечении из раны вытекает кровь:
 - а) темно-вишневая
 - б) алая
 - в) красная
4. Оказывая помощь пострадавшему с ожогом стопы кислотой, в первую очередь следует:
 - а) промыть ожог 2% раствором пищевой соды
 - б) наложить стерильную салфетку
 - в) промыть ожог чистой проточной водой
5. Пострадавшего с травмой руки транспортируют в положении:
 - а) сидя
 - б) лежа на животе
 - в) лежа на спине с опущенными ногами

Произвести обработку краев раны в области тыла кисти и наложение стерильной повязки.

БИЛЕТ № 2

1. Раствор йода из автомобильной аптечки применяют для:
 - а) промывания раны
 - б) обработки краев раны
 - в) промывания раны и обработки ее краев
2. Для обездвиживания предплечья при переломе его костей можно использовать:
 - а) кусок фанеры
 - б) вату
 - в) марлевый бинт
3. При подозрении на сотрясение головного мозга пострадавшего надо:
 - а) удобно усадить
 - б) уложить строго горизонтально, фиксировать голову прямо
 - в) уложить, повернуть голову на бок и фиксировать ее
4. При тепловом ударе пострадавшего следует перенести в тень и:
 - а) применить грелку к голове
 - б) холод к голове
 - в) грелку к ногам
5. При венозном кровотечении из раны вытекает кровь:
 - а) темно-вишневая
 - б) алая
 - в) красная

Произвести иммобилизацию при переломе костей голени подручными средствами

БИЛЕТ № 3

1. Для остановки венозного кровотечения из раны в области тыла стопы следует использовать:
 - а) максимальное сгибание конечности в суставе
 - б) жгут
 - в) давящую повязку
2. Наложение жгута выше раны следует использовать при кровотечении:
 - а) капиллярном
 - б) венозном
 - в) артериальном
3. При потере сознания во время обморока следует:
 - а) усадить пострадавшего
 - б) дать вдохнуть пары нашатырного спирта
 - в) дать выпить воды
4. Одевая пострадавшего с повреждением правой руки в первую очередь рубашку надевают на:
 - а) левую руку
 - б) правую руку
 - в) голову
5. При ссадине в области колена следует:
 - а) обработать ссадину йодом
 - б) наложить шину
 - в) наложить жгут

Произвести иммобилизацию пострадавшего с повреждением костей таза.

БИЛЕТ № 4

1. Наличие раны, в которой виден острый фрагмент кости, говорит о том, что у пострадавшего:
 - а) открытый перелом
 - б) вывих
 - в) закрытый перелом
2. При подозрении на сотрясение головного мозга пострадавшего надо:
 - а) удобно усадить
 - б) уложить строго горизонтально, фиксировать голову прямо
 - в) уложить, повернуть голову на бок и фиксировать ее
3. Первое действие при поражении электрическим током:
 - а) отключить источник электроэнергии
 - б) сделать искусственное дыхание
 - в) сделать закрытый массаж сердца
4. Транспортировку пострадавшего с вывихом плеча следует производить в положении:
 - а) лежа на спине
 - б) сидя
 - в) лежа на животе
5. Резиновый жгут из автомобильной аптечки применяют для:
 - а) остановки артериального кровотечения
 - б) обездвиживания конечности
 - в) перевязки раны

Продемонстрировать технику оказания помощи при носовом кровотечении

БИЛЕТ № 5

1. Первое действие сразу же после термического ожога кисти:
 - а) смазывание ожога жиром
 - б) наложение мажевой повязки
 - в) охлаждение кисти струей холодной воды
2. При переломе костей предплечья транспортная шина накладывается:
 - а) от кончиков пальцев до локтевого сустава
 - б) от кончиков пальцев до верхней части плеча
 - в) от лучезапястного сустава до верхней части плеча
3. В комплекс сердечно-легочной реанимации **не входит**:
 - а) закрытый массаж сердца
 - б) искусственное дыхание «изо рта в рот»
 - в) согревание пострадавшего
4. При сжимающих болях в области сердца следует:
 - а) дать таблетку валидола (нитроглицерина) под язык
 - б) сделать горячие ножные ванны
 - в) сделать закрытый массаж сердца
5. Транспортировку пострадавшего с вывихом плеча следует производить в положении:
 - а) лежа на спине
 - б) лежа на животе
 - в) сидя

Произвести наложение повязки при термическом ожоге первого пальца кисти.

БИЛЕТ № 6

1. Резиновый жгут из автомобильной аптечки применяют для:
 - а) остановки артериального кровотечения
 - б) обездвиживания конечности
 - в) перевязки раны
2. Сдавление грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации проводится:
 - а) в верхней части грудины
 - б) в средней части грудины
 - в) в нижней части грудины
3. Для профилактики попадания микробов в рану при открытом переломе следует:
 - а) наложить повязку с мазью на рану
 - б) наложить стерильную салфетку на рану
 - в) промыть рану йодом
4. При подозрении на пищевое отравление в первую очередь следует:
 - а) дать пострадавшему слабительное средство
 - б) вызвать скорую помощь
 - в) приложить грелку к животу
5. При подозрении на наличие у пострадавшего проникающего ранения груди следует наложить повязку:
 - а) герметичную (воздухонепроницаемую)
 - б) с мазью
 - в) давящую

Произвести наложение повязки при ранении волосистой части

БИЛЕТ № 7

1. Чтобы уменьшить венозное кровотечение из раны на конечности конечность следует:
 - а) опустить ниже уровня тела
 - б) приподнять выше уровня тела
 - в) согнуть в суставе выше раны
2. Сердечно-легочная реанимация необходима при:
 - а) клинической смерти
 - б) биологической смерти
 - в) сильных болях в сердце
3. При отсутствии сознания у пострадавшего пульс определяется:
 - а) на височной артерии
 - б) на бедренной артерии
 - в) на сонной артерии.
4. Для термического ожога II степени характерно:
 - а) жгучая боль, покраснение и отек кожи
 - б) появление пузырей со светлым содержимым
 - в) появление темной корки (струпа)
5. Перед транспортировкой пострадавшего с подозрением на повреждение позвоночника его:
 - а) укладывают на щит на спину
 - б) усаживают на стул или кресло
 - в) укладывают на носилки на бок

Произвести остановку венозного кровотечения из раны в нижней части голени.

БИЛЕТ № 8

1. Резиновый жгут из автомобильной аптечки применяют для:
 - а) обездвиживания конечности
 - б) остановки артериального кровотечения
 - в) перевязки раны
2. Сдавление грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации проводится:
 - а) в верхней части грудины
 - б) в средней части грудины
 - в) в нижней части грудины
3. Для профилактики попадания микробов в рану при открытом переломе следует:
 - а) наложить повязку с мазью на рану
 - б) наложить стерильную салфетку на рану
 - в) промыть рану йодом
4. При переломе фаланги пальца кисти вместо шины можно использовать:
 - а) марлевый бинт
 - б) линейку
 - в) эластичный бинт
5. Давящую повязку следует применить при наличии кровоточащей раны в области:
 - а) бедра
 - б) ягодицы
 - в) лба

Продемонстрировать технику оказания неотложной помощи при обмороке.

БИЛЕТ № 9

1. Наложение жгута выше раны следует использовать при кровотечении:
 - а) капиллярном
 - б) венозном
 - в) артериальном
2. При потере сознания во время обморока следует:
 - а) усадить пострадавшего
 - б) дать выпить воды
 - в) дать вдохнуть пары нашатырного спирта
3. При переломе костей голени шины накладываются следующим образом:
 - а) одна шина по задней поверхности голени и одна по наружной
 - б) две шины по наружной и внутренней поверхности голени
 - в) только одна шина по задней поверхности голени и стопы
4. Одевая пострадавшего с повреждением левой руки в первую очередь рубашку надевают на:
 - а) левую руку
 - б) правую руку
 - в) голову
5. При ссадине в области колена следует:
 - а) наложить шину
 - б) обработать ссадину йодом
 - в) наложить жгут

Произвести иммобилизацию предплечья подручными средствами.

БИЛЕТ № 10

1. Накладывая транспортные шины при переломе бедра надо зафиксировать:
 - а) тазобедренный сустав
 - б) коленный сустав
 - в) тазобедренный, коленный и голеностопный суставы
2. Первая помощь при ранении мягких тканей включает:
 - а) промывание раны, наложение стерильной повязки
 - б) обработку краев раны, наложение стерильной повязки
 - в) только наложение стерильной повязки
3. При сильном ушибе живота во время ДТП **нельзя**:
 - а) применять холод на живот
 - б) укладывать пострадавшего
 - в) давать пострадавшему пить
4. Оказывая помощь пострадавшему с ожогом кисти щелочью, в первую очередь следует:
 - а) промыть ожог 2% раствором уксусной или лимонной кислоты
 - б) промыть ожог чистой проточной водой
 - в) наложить стерильную салфетку
4. Давящую повязку следует применить при наличии кровоточащей раны в области:
 - а) бедра
 - б) ягодицы
 - в) лба

Наложить повязку при растяжении связок голеностопного сустава.

БИЛЕТ № 11

1. Признаки, позволяющие заподозрить внутреннее кровотечение в брюшную полость:
 - а) боль в животе, бледность, частый пульс, холодная кожа
 - б) боль в животе, высокая температура тела, частый пульс
 - в) боль в животе, нормальный пульс, жидкий стул (понос)
2. Первая помощь при ранении мягких тканей включает:
 - а) промывание раны, наложение стерильной повязки
 - б) обработку краев раны, наложение стерильной повязки
 - в) только наложение стерильной повязки
3. Оказывая первую помощь при вывихе плеча **нельзя**:
 - а) вправлять вывих
 - б) применять косыночную повязку
 - в) успокаивать пострадавшего
4. Охлаждающий пакет из автомобильной аптечки можно использовать для:
 - а) остановки кровотечения
 - б) уменьшения отека
 - в) остановки кровотечения и уменьшения отека
4. При носовом кровотечении голову следует:
 - а) запрокинуть кзади
 - б) наклонить кпереди
 - в) наклонить к надплечью

Продемонстрировать технику непрямого массажа сердца.

БИЛЕТ № 12

1. Признаками клинической смерти являются:
 - а) отсутствие сердцебиения и дыхания, расширение зрачка
 - б) отсутствие сердцебиения и дыхания, сужение зрачка
 - в) отсутствие дыхания, пульс только на сонной артерии
2. **Главный** симптом вывиха в крупном суставе (например, в плечевом):
 - а) появление кровоподтека
 - б) боль в суставе
 - в) западение мягких тканей над суставом («пустой сустав»)
3. Жгучая боль, покраснение и отек кожи говорят о термическом ожоге:
 - а) I степени
 - б) II степени
 - в) III степени
4. Продолжительность проведения реанимационных мероприятий:
 - а) 5-10 минут
 - б) 15-20 минут
 - в) 40-45 минут
5. При переломе костей стопы шина накладывается:
 - а) от кончиков пальцев до голеностопного сустава
 - б) от кончиков пальцев до средней части голени
 - в) от кончиков пальцев до средней части бедра

Продемонстрировать технику искусственной вентиляции легких методом «изо рта в рот».

БИЛЕТ № 13

1. S-образная трубка в автомобильной аптечке нужна для:
 - а) восстановления проходимости дыхательных путей
 - б) проведения закрытого массажа сердца
 - в) остановки капиллярного кровотечения
2. Соотношение сдавливания грудной клетки и дыхательных движений при оказании помощи двумя спасателями:
 - а) 1:1
 - б) 1:5
 - в) 2:10
3. Для остановки венозного кровотечения из раны в области тыла стопы следует использовать:
 - а) максимальное сгибание конечности в суставе
 - б) жгут
 - в) давящую повязку
4. Наложение жгута выше раны следует использовать при кровотечении:
 - а) капиллярном
 - б) венозном
 - в) артериальном
5. При переломе костей голени шины накладываются следующим образом:
 - а) только одна шина по задней поверхности голени и стопы
 - б) две шины по наружной и внутренней поверхности голени
 - в) одна шина по задней поверхности голени и одна по наружной

Продемонстрировать технику оказания помощи при растяжении связок голеностопного сустава.

БИЛЕТ № 14

1. В комплекс сердечно-легочной реанимации **не входит**:
 - а) закрытый массаж сердца
 - б) искусственное дыхание «изо рта в рот»
 - в) согревание пострадавшего
2. При сжимающих болях в области сердца следует:
 - а) сделать горячие ножные ванны
 - б) дать таблетку валидола (нитроглицерина) под язык
 - в) сделать закрытый массаж сердца
3. При отсутствии жесткой шины для иммобилизации голени можно использовать:
 - а) бинтовую повязку
 - б) фиксацию поврежденной голени к здоровой
 - в) наложение эластичного бинта
4. S-образная трубка в автомобильной аптечке нужна для:
 - а) восстановления проходимости дыхательных путей
 - б) проведения закрытого массажа сердца
 - в) остановки капиллярного кровотечения
5. При вывихе нижней челюсти следует:
 - а) вправить вывих на месте происшествия
 - б) наложить пращевидную повязку на челюсть, отвезти в больницу
 - в) согреть пострадавшего, отвезти в больницу

Продемонстрировать технику остановки капиллярного кровотечения из раны в области лба.

БИЛЕТ № 15

1. При попадании инородного тела в дыхательные пути **нельзя**:
 - а) наклонять пострадавшего кпереди
 - б) наносить удары в межлопаточной области
 - в) укладывать пострадавшего на спину
2. Оказывая помощь пострадавшему с ожогом кисти щелочью, в первую очередь следует:
 - а) промыть ожог 2% раствором уксусной или лимонной кислоты
 - б) промыть ожог чистой проточной водой
 - в) наложить стерильную салфетку
3. Давящую повязку следует применить при наличии кровоточащей раны в области:
 - а) бедра
 - б) ягодицы
 - в) лба
4. При переломе костей голени шины накладываются следующим образом:
 - а) только одна шина по задней поверхности голени и стопы
 - б) две шины по наружной и внутренней поверхности голени
 - в) одна шина по задней поверхности голени и одна по наружной
4. Раствор йода из автомобильной аптечки применяют для:
 - а) промывания раны
 - б) обработки краев раны
 - в) промывания раны и обработки ее краев

Произвести наложение повязки при ранении правого глаза.

БИЛЕТ № 16

1. Признаками пищевого отравления являются:
 - а) боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул (понос)
 - б) головная боль, головокружение, запор
 - в) боль в груди, сердцебиение, одышка
2. При утомлении внимание водителя автомобиля:
 - а) усиливается
 - б) снижается
 - в) не меняется
3. Первое действие сразу же после термического ожога кисти:
 - а) смазывание ожога жиром
 - б) наложение мажевой повязки
 - в) охлаждение кисти струей холодной воды
4. При переломе костей предплечья транспортная шина накладывается:
 - а) от кончиков пальцев до локтевого сустава
 - б) от кончиков пальцев до верхней части плеча
 - в) от лучезапястного сустава до верхней части плеча
5. Соотношение сдавливания грудной клетки и дыхательных движений при оказании помощи двумя спасателями:
 - а) 1:1
 - б) 1:5
 - в) 2:10

Произвести остановку артериального кровотечения из раны на предплечье с помощью жгута

БИЛЕТ № 17

1. При вывихе нижней челюсти следует:
 - а) вправить вывих на месте происшествия
 - б) наложить пращевидную повязку на челюсть, отвезти в больницу
 - в) согреть пострадавшего, отвезти в больницу
2. Признак перелома ребра:
 - а) припухлость
 - б) деформация ребра по типу ступени
 - в) боль при кашле
3. При переломе костей стопы шина накладывается:
 - а) от кончиков пальцев до голеностопного сустава
 - б) от кончиков пальцев до средней части голени
 - в) от кончиков пальцев до средней части бедра
4. Признаками пищевого отравления являются:
 - а) боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул (понос)
 - б) головная боль, головокружение, запор
 - в) боль в груди, сердцебиение, одышка
4. При утомлении внимание водителя автомобиля:
 - а) усиливается
 - б) снижается
 - в) не меняется

Произвести наложение повязки при ране в области коленного сустава.

БИЛЕТ № 18

1. При артериальном кровотечении из раны вытекает кровь:
 - а) темно-вишневая
 - б) алая
 - в) красная
2. Для остановки капиллярного кровотечения из раны в области предплечья следует использовать:
 - а) давящую повязку
 - б) жгут
 - в) закрутку
3. Оказывая первую помощь при вывихе плеча **нельзя**:
 - а) вправлять вывих
 - б) применять косыночную повязку
 - в) успокаивать пострадавшего
4. Оказывая помощь пострадавшему с ожогом стопы кислотой, в первую очередь следует:
 - а) промыть ожог 2% раствором пищевой соды
 - б) наложить стерильную салфетку
 - в) промыть ожог чистой проточной водой
5. Пострадавшего с травмой руки транспортируют в положении:
 - а) сидя
 - б) лежа на животе
 - в) лежа на спине с опущенными ногами

Наложить на рану в области предплечья повязку из лейкопластыря бактерицидного.

БИЛЕТ № 19

1. При ссадине в области колена следует:
 - а) наложить шину
 - б) обработать ссадину йодом
 - в) наложить жгут
2. Наличие раны, в которой виден острый фрагмент кости, говорит о том, что у пострадавшего:
 - а) открытый перелом
 - б) вывих
 - в) закрытый перелом
3. При подозрении на сотрясение головного мозга пострадавшего надо:
 - а) удобно усадить
 - б) уложить строго горизонтально, фиксировать голову прямо
 - в) уложить, повернуть голову на бок и фиксировать ее
4. При тепловом ударе пострадавшего следует перенести в тень и:
 - а) применить грелку к голове
 - б) холод к голове
 - в) грелку к ногам
5. Признаками пищевого отравления являются:
 - а) боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул (понос)
 - б) головная боль, головокружение, запор
 - в) боль в груди, сердцебиение, одышка

Произвести укладку пострадавшего с переломом костей таза.

БИЛЕТ № 20

1. Охлаждающий пакет из автомобильной аптечки можно использовать для:
 - а) остановки кровотечения
 - б) уменьшения отека
 - в) остановки кровотечения и уменьшения отека
2. При носовом кровотечении голову следует:
 - а) запрокинуть кзади
 - б) наклонить кпереди
 - в) наклонить к надплечью
3. Признаками клинической смерти являются:
 - а) отсутствие сердцебиения и дыхания, расширение зрачка
 - б) отсутствие сердцебиения и дыхания, сужение зрачка
 - в) отсутствие дыхания, пульс только на сонной артерии
4. **Главный** симптом вывиха в крупном суставе (например, в плечевом):
 - а) появление кровоподтека
 - б) боль в суставе
 - в) западение мягких тканей над суставом («пустой сустав»)
5. При отсутствии жесткой шины для иммобилизации голени можно использовать:
 - а) бинтовую повязку
 - б) фиксацию поврежденной голени к здоровой
 - в) наложение эластичного бинта

Произвести иммобилизацию при переломе костей правого предплечья.